

**BILAN DES ACCOUCHEMENTS DES FEMMES
SÉROPOSITIVES À LA MATERNITÉ DE BICHAT
CLAUDE BERNARD**

DE JANVIER 2007 À DÉCEMBRE 2007

**79 accouchements de femmes séropositives sur 2132 accouchements soit 3.7 %
Le terme de l'accouchement en médiane est 37S + 3 [24 S + 0 - 41 S + 2]**

**14 % des femmes ont découvert leur séropositivité au cours de leur
grossesse 2007.**

**81 bébés nés (2 grossesses gémellaires)
1 bébé décédé d'une infection à Strepto B**

Pour l'année 2007 : 0 BÉBÉ CONTAMINÉ À CE JOUR

DESCRIPTION DES PATIENTES A L'ACCOUCHEMENT

Age médian (ans)	32 [17 - 41]
Accouchement par césarienne	(53 sur 79) soit 67 %
Accouchement par voies basses	(26 sur 79) soit 33 %
VIH-1	(76 sur 79) soit 96.2 %
VIH-2	(3 sur 79) soit 3.8 %
Médiane des CD4 /mm ³	461 [48 - 1072]
% CV VIH-1 < 50 copies/ml	60 cas / 75
% CV VIH-1 < 200 copies/ml	69 cas / 75
% CV VIH-2 < 100 copies/ml	2 cas / 3

PAYS D'ORIGINE DES PATIENTES

	N	%
Afrique Noire	67	84.8
France et Europe	8	10.1
Carâibes	3	3.8
Russie	1	1.3

La majorité des patientes sont originaires d'Afrique Noire (84.8 %) dont 44.3 % de Côte d'Ivoire, 8.9 % du Cameroun et 8.9 % du Congo.

TRAITEMENT

Traitement reçu durant les 4 semaines précédant la grossesse

	N	%
Sans traitement	41	51.9
Monothérapie	1	1.3
Bithérapie	1	1.3
Trithérapie	33	41.8
Quadrithérapie	3	3.8

Monothérapie : LPV/RTV (1)

Bithérapie : TDF/FPV/RTV (1)

Trithérapie : 3TC/ddI/EFV (1), CBV/ATV/RTV (2), CBV/EFV (3), CBV/LPV/RTV (8), CBV/NVP (2), ddI/3TC/LPV/RTV (2), TVD/ATV/RTV (3), TZV (2), TDF/ddI/ATV/RTV (1), TVD/NVP (1), CBV/IDV/RTV (2), CBV/FPV/RTV (1), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), TVD/EFV (1), ddI/3TC/ATV/RTV (1), AZT/ABC/NFV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie : CBV/TDF/ATV/RTV (2), TVD/LPV/SQV/RTV (1)

Traitement reçu au cours du 1^{er} trimestre de grossesse

	N	%
Sans traitement	25	31.6
Monothérapie	1	1.3
Bithérapie	1	1.3
Trithérapie	49	62.0
Quadrithérapie	2	2.5
Pentathérapie	1	1.3

Monothérapie : LPV/RTV (1)

Bithérapie : TDF/LPV/RTV (1)

Trithérapie : CBV/ATV/RTV (2), CBV/LPV/RTV (24), CBV/NVP (3), ddI/3TC/LPV/RTV (2), TVD/ATV/RTV (3), TDF/ddI/ATV/RTV (1), ABC/NVP/AZT (1), AZT/ABC/LPV/RTV (1), 3TC/ddI/LPV/RTV (1), CBV/FPV/RTV (3), CBV/IDV/RTV (2), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), TVD/NFV (1), ABC/3TC/FPV/RTV (1), ddI/3TC/ATV/RTV (1), AZT/ABC/NFV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie : CBV/TDF/ATV/RTV (2)

Pentathérapie : TVD/ABC/LPV/SQV/RTV (1)

Traitement reçu au cours du 2^{ème} trimestre de grossesse

	N	%
Sans traitement	6	7.6
Monothérapie	1	1.3
Bithérapie	2	2.5
Trithérapie	67	84.8
Quadrithérapie	2	2.5
Pentathérapie	1	1.3

Monothérapie : LPV/RTV (1)

Bithérapie : CBV (1), TDF/ LPV/RTV (1)

Trithérapie : 3TC/ddI/LPV/RTV (1), AZT/3TC/ATV/RTV (1), AZT/NVP/SQV/RTV (1), CBV/ATV/RTV (2), CBV/LPV/RTV (43), CBV/NVP (2), ddI/3TC/LPV/RTV (1), TVD/ATV/RTV (2), TDF/ddI/ATV/RTV (1), ABC/NVP/AZT (1), AZT/ABC/LPV/RTV (1), CBV/FPV/RTV (3), CBV/IDV/RTV (2), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), CBV/ SQV/ RTV (1), , ABC/3TC/FPV/RTV (1), CBV/SQV/RTV (1), ABC/AZT/LPV/RTV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie: CBV/TDF/LPV/RTV (1)

Pentathérapie: TVD/ABC/LPV/SQV/RTV (1)

Traitement reçu au cours du 3^{ème} trimestre de grossesse

	N	%
Bithérapie	3	3.8
Trithérapie	73	93.6
Quadrithérapie	1	1.3
Pentathérapie	1	1.3

Bithérapie : CBV (1), AZT/LPV (1), TDF/LPV/RTV (1)

Trithérapie : 3TC/ddI/LPV/RTV (1), AZT/3TC/ATV/RTV (1), AZT/ABC/NFV (1), AZT/NVP/SQV/RTV (1), CBV/ATV/RTV (2), CBV/LPV/RTV (46), CBV/NVP (1), CBV/SQV/RTV (5), TVD/ATV/RTV (3), TDF/ddI/ATV/RTV (1), ABC/NVP/AZT (1), AZT/ABC/LPV/RTV (1), CBV/FPV/RTV (3), CBV/IDV/RTV (2), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), ABC/3TC/FPV/RTV (1), Kivexa/SQV/RTV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie : ddI/3TC/IDV/LPV/RTV (1)

Pentathérapie : TVD/ABC/LPV/SQV/RTV (1)