

**BILAN DES ACCOUCHEMENTS DES FEMMES
SÉROPOSITIVES À LA MATERNITÉ DE BICHAT
CLAUDE BERNARD**

DE JANVIER 2008 À DÉCEMBRE 2008

79 accouchements de femmes séropositives sur **2286** accouchements soit **3.5 %**
Le terme de l'accouchement en médiane est **33S + 3** [27 S + 0 - 41 S + 6]

Pour l'année 2008 : 0 BÉBÉ CONTAMINÉ À CE JOUR

DESCRIPTION DES PATIENTES A L'ACCOUCHEMENT

Age médian (ans)	31 [19 - 45]	
Accouchement par césarienne	44/79 soit 56%	
Accouchement par voies basses	33/79 soit 42%	
	2 indéterminés	
Médiane des CD4 /mm ³	498 [81 - 1098]	
% CV VIH-1 indétectables	64 / 79 (81%) dont	2 < 100 cp/ml
		6 < 40 cp/ml
		56 < 50 cp/ml
% CV VIH-1 détectables	12 / 79 (15%)	

PAYS D'ORIGINE DES PATIENTES

	N	%
Indéterminé	5	6
France	5	6
Caraïbes	2	2.5
Afrique Sub-saharienne	63	80
Afrique Nord	3	4
Asie	1	1.5

La majorité des patientes sont originaires d'Afrique Sub-saharienne (80 %)

TRAITEMENT

Traitement reçu durant les 4 semaines précédant la grossesse

	N	%
Sans traitement	32	41
Monothérapie	0	0
Bithérapie	1	1.5
Trithérapie	41	52.5
Quadrithérapie	2	2.5
Indéterminé	2	2.5

Bithérapie : CBV (1) 3TC, SQV/RTV (1)

Trithérapie : TZV, LPV/RTV (1) TVD, NVP(1) TVD, LPV/RTV (1) TVD, EFV (2)

TVD, DRV/RTV (1) TVD, ATV/RTV (2) TDF, DDI, ATV/RTV (1) KIV, LPV/RTV (1)

KIV, FPV/RTV (1) CBV, SQV/RTV (1) CBV, NVP (4) CBV, LPV/RTV (17) CBV, IDV/RTV (1) CBV, ATV/RTV (2) 3TC, DDI, NVP (1) 3TC, DDI, LPV/RTV (2) 3TC, DDI, ATV/RTV (2) TZV (1)
 Quadrithérapie : CBV, T-20, DRV/RTV (1)

Traitement reçu au cours du 1^{er} trimestre de grossesse

	N	%
Sans traitement	25	31.6
Monothérapie	1	1.3
Bithérapie	1	1.3
Trithérapie	49	62
Quadrithérapie	2	2.5
Pentathérapie	1	1.3

Monothérapie : LPV/RTV (1)

Bithérapie : TDF/LPV/RTV (1)

Trithérapie : CBV/ATV/RTV (2), CBV/LPV/RTV (24), CBV/NVP (3), ddI/3TC/LPV/RTV (2), TVD/ATV/RTV (3), TDF/ddI/ATV/RTV (1), ABC/NVP/AZT (1), AZT/ABC/LPV/RTV (1), 3TC/ddI/LPV/RTV (1), CBV/FPV/RTV (3), CBV/IDV/RTV (2), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), TVD/NFV (1), ABC/3TC/FPV/RTV (1), ddI/3TC/ATV/RTV (1), AZT/ABC/NFV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie : CBV/TDF/ATV/RTV (2)

Pentathérapie : TVD/ABC/LPV/SQV/RTV (1)

Traitement reçu au cours du 2^{ème} trimestre de grossesse

	N	%
Sans traitement	6	7.5
Monothérapie	1	1.5
Bithérapie	2	2.5
Trithérapie	67	84.5
Quadrithérapie	2	2.5
Pentathérapie	1	1.5

Monothérapie : LPV/RTV (1)

Bithérapie : CBV (1), TDF/ LPV/RTV (1)

Trithérapie : 3TC/ddI/LPV/RTV (1), AZT/3TC/ATV/RTV (1), AZT/NVP/SQV/RTV (1), CBV/ATV/RTV (2), CBV/LPV/RTV (43), CBV/NVP (2), ddI/3TC/LPV/RTV (1), TVD/ATV/RTV (2), TDF/ddI/ATV/RTV (1), ABC/NVP/AZT (1), AZT/ABC/LPV/RTV (1), CBV/FPV/RTV (3), CBV/IDV/RTV (2), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), CBV/ SQV/ RTV (1), , ABC/3TC/FPV/RTV (1), CBV/SQV/RTV (1), ABC/AZT/LPV/RTV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie: CBV/TDF/LPV/RTV (1)

Pentathérapie: TVD/ABC/LPV/SQV/RTV (1)

Traitement reçu au cours du 3^{ème} trimestre de grossesse

	N	%
Bithérapie	3	3.5
Trithérapie	73	93.5
Quadrithérapie	1	1.5
Pentathérapie	1	1.5

Bithérapie : CBV (1), AZT/LPV (1), TDF/LPV/RTV (1)

Trithérapie : 3TC/ddI/LPV/RTV (1), AZT/3TC/ATV/RTV (1), AZT/ABC/NFV (1), AZT/NVP/SQV/RTV (1), CBV/ATV/RTV (2), CBV/LPV/RTV (46), CBV/NVP (1), CBV/SQV/RTV (5), TVD/ATV/RTV (3), TDF/ddI/ATV/RTV (1), ABC/NVP/AZT (1), AZT/ABC/LPV/RTV (1), CBV/FPV/RTV (3), CBV/IDV/RTV (2), 3TC/ABC/LPV/RTV (1), ABC/3TC/FPV/RTV (1), Kivexa/SQV/RTV (1), ABC/ddI/ATV/RTV (1)

Quadrithérapie : ddI/3TC/IDV/LPV/RTV (1)

Pentathérapie : TVD/ABC/LPV/SQV/RTV (1)