

# LA GENERALISATION DES TROD VIH NE RISQUE-T-ELLE PAS D'AUGMENTER LE SOUS-DIAGNOSTIC DES HEPATITES VIRALES ?

Auteurs : **F. Louni<sup>1</sup>**, S. Le Gac<sup>1</sup>, S. Rumi<sup>1</sup>, A. Lefebvre Roque<sup>1</sup>, Y. Yazdanpanah<sup>1</sup>, E. Bouvet<sup>1</sup>

(1) GHU Paris Nord Val de Seine Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital Bichat Claude Bernard. CONTACT : francoise.louni@bch.aphp.fr

## Objectifs


Evaluer le **taux de remise des résultats des marqueurs des hépatites virales chez les personnes ayant eu un Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD) au VIH dans un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG).**

## Méthodes


- Enquête rétrospective à partir des données recueillies en 2012 et 2013 au moyen d'une grille standardisée concernant les personnes ayant eu un TROD VIH associé à des sérologies hépatiques.
- Test du  $\chi^2$  pour les analyses statistiques.

## Résultats

### Evolution du nombre de TROD VIH




### Prescription des marqueurs des hépatites associée au TROD VIH



**Augmentation significative des prescriptions des marqueurs des hépatites associées au TROD en 2013**

### Rendu des résultats des marqueurs des hépatites dans le cadre d'une prescription associée ou non à un TROD VIH en 2013



**36% (389/1073) des dépistés VIH par TROD ne reviennent pas chercher leurs résultats des marqueurs hépatites (contre 10% des dépistés VIH hors TROD)**

Caractéristiques socio-démographiques (N=389)

- En majorité :
- sexe masculin (64%)
  - âgés de 20 à 39 ans (82%)
  - pays de naissance : Europe occidentale et centrale (79%)
  - orientation sexuelle : hétérosexuelle (82%)

**Parmi les dépistés non revenus, 1.8% (7/389) ont eu une antigénémie HBs ou une sérologie VHC positive ou douteuse**

	n (%)
Sexe masculin	7 (100%)
Age 26 à 34 ans	7 (100%)
Origine géographique :	
France	4 (57%)
Afrique sub-saharienne	3 (43%)
Orientation sexuelle : hétérosexuelle	7 (100%)

## Conclusion

Cette étude menée sur notre territoire montre que la **prescription des sérologies hépatiques avec TROD accentue significativement** la non remise des résultats des hépatites et de ce fait **le nombre de personnes porteuses non informées de leur infection.**

Il apparaît donc indispensable pour répondre aux missions des CDAG :

- d'adapter les prescriptions de TROD VIH, dans l'attente de la disponibilité des tests rapides VHB, VHC, en les limitant aux cas sans indication à d'autres dépistages en dehors d'une demande express des personnes,
- d'insister auprès des médecins du CDAG pour qu'ils les sensibilisent à l'importance des résultats des autres examens.