

DEPITROD

Etude de faisabilité des TROD pour le VIH en
médecine libérale

Plénière COREVIH IDF Nord

Le 02/10/13

CONTEXTE

Plan national SIDA 2010-2014 : améliorer le dépistage du VIH

Les médecins généralistes sont des piliers du dépistage ++

➤ Etude DEPIVIH 2010 (GERVIH)

- 382 TROD réalisés par 62 médecins
- Acceptabilité et faisabilité du **TROD Vikia©** (lecture différée 30 minutes)
 - 99.7 % d'acceptabilité (patients)
 - taux de réalisation (faisabilité) 1.5 %
- **Limites : difficultés techniques, temps de réalisation**

➤ DEPITROD : COREVIH IDF Nord

évaluation avec le test INSTI©, lecture immédiate

DEPITROD – OBJECTIFS DE L'ETUDE

Etude prospective observationnelle d'évaluation de la faisabilité des TROD en médecine ambulatoire

Les TROD peuvent-ils être un outil de dépistage en ville ?

➤ Critère primaire d'évaluation : **faisabilité évaluée par le taux de réalisation**

(comparabilité avec DEPIVIH : nb de tests réalisés / nombre de patients théoriquement incluables vus durant la période)

➤ Critères secondaires :

- Satisfaction des patients évaluée par auto-questionnaire
- satisfaction pour le médecin évaluée par questionnaire individuel au cours d'un entretien, recueil des éventuelles difficultés

METHODE - Investigateurs

- Tous les médecins généralistes, dermatologues, gynécologues de Paris 18^{ème}, Clichy la Garenne, Levallois-Perret (territoires affiliés à la COREVIH IDF Nord) ont été invités à participer
 - invitations par courrier (2), relance téléphonique
- 28 investigateurs recrutés (11.86% des sollicités, médecins généralistes)
- Une réunion de présentation du protocole et de formation à l'utilisation des TROD a eu lieu : 6 présents. Les autres médecins ont été formés à leurs cabinets.
- Ils ont reçu à l'issue de cette formation : une boîte de 24 tests INSTI, un lot de 25 questionnaires patients, une affiche à placer en salle d'attente (fournie par le labo)
- **Mission : proposer aux patients (recommandation HAS) un TROD pour le VIH** Le résultat du test n'était pas recueilli.
- **Durée : 1 mois, menée entre avril et mai 2013 – prolongée (à 5.9sem en moy)**
- **Critères d'inclusion des patients : tout patient majeur et consentants**

METHODE – LES QUESTIONNAIRES

PATIENT (Après réalisation du TROD)

-AGE, SEXE

-Avez-vous déjà réalisé un dépistage pour le VIH ?

- Si oui : il y a moins d'un an, moins de 5 ans ?
- Si oui, avez vous récupéré le résultat ?

-Avez vous l'intention de réaliser prochainement un dépistage ?

-Avez-vous déjà réalisé un TROD pour le VIH ?

-Evaluation du TROD

- Etes-vous satisfait que votre médecin vous ait proposé un TROD ?
- Le prélèvement a-t-il été douloureux ?
- Recommanderiez vous cette technique de prélèvement ?
- Le test a lecture immédiate vous a-t-il davantage angoissé qu'une sérologie classique ?

MEDECIN (Unique, a l'issue de l'étude)

-Etes vous globalement satisfait du TROD ?

-Etes vous globalement satisfait du temps de réalisation ?

-Avez-vous rencontré des difficultés ?

- Pas de difficulté particulière
- Recueil du sang
- Chronophage
- Refus des patients
- Autre

-Seriez vous prêt a continuer à vous en servir dans votre pratique de médecin généraliste ?

-Seriez vous prêt a continuer à vous en servir sachant qu'ils ne sont actuellement pas remboursés ?

-Pensez vous que c'est un outil utilisable en médecine de ville ?

RESULTATS

Durée : 3 à 8 semaines selon les investigateurs

- 140 TRODs ont été réalisés par 21 Médecins
- 7 médecins n'ont fait aucun TROD
- Nombre moyen de TROD réalisés pour l'ensemble des médecins : 5

(Min 0 – Max 22)

➤ RESULTATS

- Critère de jugement principal : taux de réalisation
- Critères de jugements secondaires : satisfaction des patients, opinion et satisfaction des médecins, difficultés rencontrées

CRITERE PRINCIPAL D'EVALUATION

CRITERE PRINCIPAL D'EVALUATION (faisabilité)

➤ **Taux de réalisation 1,2 %** (Min 0 – Max 7,86%)

- Nombre de TROD réalisé / Nombre de patients majeurs vus sur la période (Relevé individuel d'activité)
- Pourcentage de patients dépistés grâce à cette nouvelle procédure (en moyenne, par médecin)

CRITERES D'EVALUATION SECONDAIRES

1- SATISFACTION VIS-À-VIS DU TROD

➤ PATIENTS (n=140)

- Satisfaction globale : 98.5 %
- Recommandent cette technique de prélèvement : 96.4%

➤ MEDECINS ayant réalisé des TROD (n=21/28)

- Satisfaction globale : 74.5%
- Satisfaits du temps de réalisation : 71.4%
- Utilisable en consultation : 15/21 (71.4%)
- Prêts à poursuivre l'utilisation des TROD : 17/21 (81%)

2- DIFFICULTES RENCONTREES POUR LES MEDECINS

- Difficultés : 23% pb technique, manque de temps en consultation cité par 20%

RESULTAT – LA POPULATION

Caractéristiques de la population			
Ensemble de la population incluse		N=140	
SEXE	Effectif	138	(98.6%)
	Femme	77	(55.8%)
	Homme	61	(44.2%)
	NR	2	(1.4%)
AGE			
	Moyenne	39.6	
	Médiane/Min / Max	36.5/19/77	

RESULTATS – LA POPULATION (2)

Caractéristiques de la population vis-à-vis du dépistage du VIH

Ensemble de la population incluse		N=140	
Patients ayant déjà été dépisté pour le VIH	OUI	105	(75%)
	NON	35	(25%)
Patients n'ayant pas récupéré le résultat	Effectif (taux de réponse)	105	(75%)
	NON	6	(5.7%)
Ancienneté du dernier test	< 1 an	27	(19.3%)
	1-5 ans	66	(47.1%)
	> 5 ans	7	(5%)
	NR	5	(3.6%)
Patients ayant déjà eu un TROD pour le VIH	OUI	12	(8.6%)
	NON	128	(91.4%)
Patients ayant l'intention de se dépister prochainement	OUI	68	(48.6%)
	NON	72	(51.4%)

PREMIER DEPISTAGE

25% de l'échantillon concerné

60 % hommes – 40 % femmes

	FEMME	HOMME
Moyenne	42 ans	38 ans
Min	19	19
Médiane	37	31
Max	77	77

18-35 ans : 17 (48.6%)

35-50 ans : 10 (28.6%)

> 50 ans : 9 (25.7%)

Satisfaction des patients vis-à-vis du TROD**N=140****Etes-vous satisfait que votre médecin vous ait proposé le TROD ?**

Très satisfaits	94	(67.1%)
Satisfaits	44	(31.4%)
Moyennement satisfaits	2	(1.4%)
Pas du tout satisfaits	0	(0%)

Le prélèvement a-t-il été douloureux ?

Pas du tout	52	(37.1%)
Peu douloureux	76	(54.3%)
Moyennement douloureux	11	(7.9%)
Très douloureux	1	(0.7%)

Méthode plus anxiogène qu'un dépistage standard ?

OUI	17	(12.1%)
NON	123	(87.9%)

Recommanderiez-vous ce type de prélèvement ?

OUI	133	(96.4%)
NON	5	(3.6%)

RESULTATS – INVESTIGATEURS

SATISFACTION

Médecins ayant répondu au questionnaire		N=21	
Etes-vous globalement satisfait du TROD ?			
Très satisfait		9	(42.8%)
Satisfait		7	(33.3%)
Moyennement satisfait		5	(23.8%)
Pas du tout satisfait		0	
Etes-vous globalement satisfait du temps de réalisation ?			
Très satisfait		7	(33.3%)
Satisfait		8	(38.1%)
Moyennement satisfait		6	(28.6%)
Pas du tout satisfait		0	

INVESTIGATEURS – SATISFACTION (2)

Opinion des médecins vis-à-vis des TROD		N=21	N=28	
Pensez-vous que le TROD est utilisable en consultation de MG ?				
	OUI	15	(71.4%)	(53.5%)
	NON	5	(23.8%)	(17.9%)
	NSPP	1	(4.8%)	8 (28.6%)
Seriez-vous prêt à continuer à vous en servir ?				
	OUI	17	(81%)	(61%)
	NON	4	(19%)	(14.3%)
	NSPP	0		7(25%)
Sachant que les TROD ne sont pas remboursés ?				
	OUI	4	(19%)	(14.3%)
	NON	16	(76.2%)	(57.1%)
	NSPP	1	(4.8%)	(28.6%)

RESULTATS – INVESTIGATEURS

DIFFICULTES RENCONTREES

Médecins ayant répondu au questionnaire		N=21	
Quelles difficultés avez-vous rencontré ?(plusieurs possibles)		Nb fois cité	
- Pas de difficultés particulières	8	(38.1%)	
- Recueil de la goutte de sang (problèmes techniques)	5	(23.8%)	
- Chronophage	3	(14.3%)	
- Refus des patients	1	(4.8%)	
- Autres	7	(33.3%)	

Autres difficultés citées (plusieurs possibles) n=7		Nb fois cité	
Préférence pour bilan IST complet	4	(19%)	
Gene par le délai de 3 mois	2	(9.5%)	
Peur de gérer une annonce positive en consultation	1	(4.8%)	
Manque de temps dans la consultation	4	(19%)	
Ne fait pas de dépistage	2	(9.5%)	
Pas d'apport dans la pratique	1	(4.8%)	

RAISONS DE LA NON - UTILISATION DES TROD

Les 7 médecins concernés ont évoqué

- Ne pas avoir le temps en consultation (3)
- S'être reposé sur l'affiche mise en salle d'attente mais n'avoir eu aucune demande (2)
- Ne pas y penser (1)
- Ne pas savoir comment l'intégrer dans une consultation pour un autre motif (1)
- Avoir proposé mais les patients ont préféré la sérologie (1)
- Préférence pour prescription de bilan IST complet (1)
- Avoir une patientèle inadaptée pour le dépistage (âgée) (1)
- Ne se prononcent pas (2)

Représentent 25% des investigateurs

DISCUSSION

Aucun test ininterprétable, aucun positif

TROD très bien accueillis par les patients, mais on aurait aimé connaître le nombre de refus de réalisation du TROD et les raisons

Pour les médecins, constat mitigé :

- Satisfaction globale importante pour les 21 participants mais 25% n'en n'ont fait aucun
- Manque de temps en consultation ou préférence pour bilan IST le plus souvent évoqué
- Encore des difficultés techniques > 20% (lien avec l'absence à la formation organisée probable) mais qui ne paraissent pas être un frein majeur et très inf à DEPIVIH (>60%)
- Motivation à faire des TROD dans le cadre du protocole, mais en dehors?
- In fine : groupe de médecins intéressés, formation préalable +++
- 2 médecins qui n'en ont pas fait se disaient intéressés à le faire dans le cadre de campagnes de dépistage : tester des campagnes ponctuelles en ville ?

CONCLUSION

Rapidité et facilité d'utilisation du test INSTI semble le rendre adapté à la médecine libérale

Patients très satisfaits

Certains médecins encore réticents par manque de temps le plus souvent mais 61% se disent prêts à continuer à s'en servir

>> la formation des médecins est essentielle pour les sensibiliser au dépistage