

Le dépistage du VIH peut se faire :



Par TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostic) sur une goutte de sang au doigt

- ⇒ Résultat immédiat
- ⇒ Fiable en l'absence d'exposition dans les 3 derniers mois



Par une sérologie sur une prise de sang

- ⇒ Fiable à 100% seulement en l'absence d'exposition dans les 6 dernières semaines
- ⇒ Peut être associée au dépistage des hépatites B et C

Tests à renouveler en cas d'exposition à risque récente

En cas de résultat positif, n'agissez pas seul, CONTACTEZ :




EMA : 55129

En 2020, **30%** des personnes diagnostiquées infectées par le VIH ont été **découvertes à un stade avancé de l'infection**. En France, **25 000 personnes infectées** par le VIH ignorent leur séropositivité.



Risques pour ces personnes infectées :


- Pas de prise en charge
- Evolution vers le SIDA
- Transmission du VIH



Proposez une sérologie de dépistage du VIH et des hépatites B et C aux patients :

- Jamais testés
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)
- Originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes
- Utilisateurs de drogues par injection (UDI)
- Eloignés du système de soins





*Quelles sont les principales IST ?

Syphilis, infection à gonocoque, à *Chlamydia trachomatis*, herpès génital...

**Quelles sont les pathologies opportunistes ?

Pneumocystose, toxoplasmose, cryptococcose, CMV, lymphome, cancer anal ou du col de l'utérus, zona, dermite séborrhéique...

***Quelles sont les signes compatibles avec une primo-infection VIH ?

Fièvre, amaigrissement, arthro-myalgies, pharyngite, adénopathies, manifestations cutanéomuqueuses, neurologiques, diarrhée, cytopénies, syndrome mononucléosique, cytolysse hépatique...