

Les indicateurs épidémiologiques territoriaux Focus sur l'Ile de France

Virginie Supervie

UMR S 1136, Inserm, UPMC, Paris

Remerciements

- **INSERM U1136** : Marty L., Lièvre L., Mary-Krause M., Roul H., Costagliola D.
- **Groupe indicateur AC 23 de l'ANRS**
- **Santé publique France** (SpF) pour les données sur la DO, notamment **Françoise Cazein**
- **Toutes les personnes qui contribuent à la FHDH et à la DO**
- Réseau Quetelet/INSEE
- Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT, Eric Janssen)
- Nathalie Bajos et Henri Panjo pour les données de l'enquête CSF
- **Et le soutien financier de l'ANRS**

Groupe indicateur ANRS AC 23*

Définir une liste d'indicateurs permettant de faire un diagnostic de la situation sur un territoire donné et mettre au point une méthode de suivi de ces indicateurs pour évaluer l'évolution de cette situation. Cette liste et méthode pourront être ensuite utilisée au niveau de chaque région au niveau des ARS, COREVIH et/ou ORS.

- **Indicateurs épidémiologiques** : découvertes de séropositivité (stade d'infection), prévalence et nouvelles admissions en ALD VIH, cascade, nouvelles contaminations (incidence), délais, population non diagnostiquée. Par groupe de transmission si possible.
- **Indicateurs pour les programmes et interventions** : activité de dépistage dans les CEGGID, communautaire, vente autotest, nombre de personnes sous PrEP, vente de préservatifs.
- **Indicateurs sur les comportements** : enquêtes (ex: EPGL, ERAS), IST.

*Dominique Costagliola, Virginie Supervie et Lise Marty (Inserm, Iplesp) Philippe Tuppin (Cnamts), Isabelle Grémy, Valérie Féron (ORS Ile de France), Nathalie Lydié, Florence Lot, Françoise Cazein (Santé Publique France), Véronique Doré, Yoann Allier et France Lert (ANRS)

Groupe indicateur ANRS AC 23*

Définir une liste d'indicateurs permettant de faire un diagnostic de la situation sur un territoire donné et mettre au point une méthode de suivi de ces indicateurs pour évaluer l'évolution de cette situation. Cette liste et méthode pourront être ensuite utilisée au niveau de chaque région au niveau des ARS, COREVIH et/ou ORS.

- **Indicateurs épidémiologiques** : découvertes de séropositivité (stade d'infection), prévalence et nouvelles admissions en ALD VIH, cascade, nouvelles contaminations (incidence), délais, population non diagnostiquée. Par groupe de transmission si possible. ➤ **diagnostic de la situation épidémiologique et évaluation de l'impact des interventions**
- **Indicateurs pour les programmes et interventions** : activité de dépistage dans les CEGGID, communautaire, vente autotest, nombre de personnes sous PrEP, vente de préservatifs.
- **Indicateurs sur les comportements** : enquêtes (ex: EPGL, ERAS), IST
- **A quelle échelle territoriale ?**

*Dominique Costagliola, Virginie Supervie et Lise Marty (Inserm, Iplesp) Philippe Tuppin (Cnamts), Isabelle Grémy, Valérie Féron (ORS Ile de France), Nathalie Lydié, Florence Lot, Françoise Cazein (Santé Publique France), Véronique Doré, Yoann Allier et France Lert (ANRS)

Epidémie de l'infection à VIH

Estimation personnes non
diagnostiquées

FHDH (DOMEVIH/NADIS/autres)

CNAMTS (ALD 7)

FHDH (DOMEVIH/NADIS/autres)


Personnes diagnostiquées
et suivies

Personnes diagnostiquées et
non suivies

Personnes non
diagnostiquées
(incidence et délais)

DO VIH (Santé publique France)

Modèle de rétrocalcul (INSERM U1136)




Taille des populations

- INSEE – population 18-64 ans – en 2013
 - Hommes/Femmes né(e)s en France (16,804,391 H et 17,189,560 F)
 - Hommes/Femmes, né(e)s à l'étranger (2,640,667 H et 2,834,335 F)
 - Hommes/Femmes, né(e)s en Afrique subsaharienne (403,290 H et 452,432 F)
- Enquête « Contexte de la sexualité en France (CSF) » menée en 2006 en France métropolitaine
 - 1,6% (1,3-2,0) des hommes ont eu au moins un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois
- Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
 - 105000 (85300-130000) personnes (76% des hommes) usagères de drogues injectables au cours des 12 derniers mois en France métropolitaine

Cascade de la prise en charge*


Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec le VIH en 2014



* Résultat provisoire

Cascade de la prise en charge*







Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec le VIH en 2014



* Résultat provisoire







Nombre de nouvelles infections en France, 2004-2014

- ~6600 nouvelles infections en 2014, (~70% chez les hommes)




Nombre de nouvelles infections en France, 2004-2014


- ~6600 nouvelles infections en 2014, (~70% chez les hommes)



Temps médian en années entre les étapes de la prise en charge du VIH en France en 2013



Temps médian en années entre les étapes de la prise en charge du VIH en France en 2013



Nb personnes non diagnostiquées en 2014

Nombre de personnes
non diagnostiquées
(95% CI)

Total	24197 (22296-25944)	
HSH nés en France	7157 (6111-8044)	30%
HSH nés à l'étranger	2025 (1624-2459)	8%
Hétérosexuelles nées à l'étranger	5159 (4398-5786)	21%
Hétérosexuelles nées en ASS	3811 (3270-4354)	74%
Hétérosexuels nés à l'étranger	5265 (4409-6446)	22%
Hétérosexuels nés en ASS	3565 (2943-4316)	68%
Hétérosexuelles nées en France	1526 (1254-1828)	6%
Hétérosexuels nés en France	2711 (2108-3476)	11%
UDI nés en France	205 (91-512)	<1%
UDI nés à l'étranger	153 (79-270)	<1%

Environ 70% des hommes

Nb personnes non diagnostiquées en 2014

Nombre de personnes
non diagnostiquées
(95% CI)

Taille population
18-64 ans*
(95% CI)

Prevalence du VIH non
diagnostiqué pour 10000
(95% CI)


Total	24197 (22296-25944)	39468952	6,1 (5,6-6,6)
HSH nés en France	7157 (6111-8044)	267668 (214713-331039)	267,9 (201,3-354,9)
HSH nés à l'étranger	2025 (1624-2459)	42062 (33740-52020)	481,6 (355,2-633,4)
Hétérosexuelles nées à l'étranger	5159 (4398-5786)	2830868 (2828844-2832069)	18,2 (15,5-20,4)
Hétérosexuelles nées en ASS	3811 (3270-4354)	451879 (451556-452070)	84,3 (72,4-96,3)
Hétérosexuels nés à l'étranger	5265 (4409-6446)	2587880 (2577924-2596546)	20,3 (17,0-24,9)
Hétérosexuels nés en ASS	3565 (2943-4316)	395228 (393707-396551)	90,2 (74,6-109,2)
Hétérosexuelles nées en France	1526 (1254-1828)	17168535 (17156260-17175817)	0,9 (0,7-1,1)
Hétérosexuels nés en France	2711 (2108-3476)	16468473 (16405114-16523617)	1,6 (1,3-2,1)
UDI nés en France	205 (91-512)	89275 (69929-112140)	22,9 (9,5-49,1)
UDI nés à l'étranger	153 (79-270)	14192 (11118-17743)	108,6 (53,1-188,7)

Environ 70% des hommes

*Insee 2013

Epidémie cachée en 2013 par région


Nombre de PVVIH non diagnostiquées :
24 700 (22 600-26 900)



Plus de 50% des PVVIH non diagnostiquées
résident en IDF, PACA et Rhône-Alpes;


Epidémie cachée en 2013 par région

Nombre de PVVIH non diagnostiquées :
24 700 (22 600-26 900)



Plus de 50% des PVVIH non diagnostiquées
résident en IDF, PACA et Rhône-Alpes;


Nombre de PVVIH non diagnostiquées
pour 10000 habitants (18-64 ans) :
6,3 (5,7 – 6,8)



Taux très élevés en Guyane, Guadeloupe
puis IDF et Martinique

Aller vers une connaissance encore plus fine

Nombre de PVVIH non diagnostiquées pour
10000 habitants (18-64 ans) :
6,3 (5,7 – 6,8)



- Les populations affectées par le VIH varient d'une région à l'autre
- Dans des régions ayant des taux plus faibles que le taux national (ex. Centre, PACA), certaines populations sont aussi affectées (e.g. HSH) que dans les régions ayant les plus forts taux
- Aller vers une connaissance encore plus fine de l'épidémie (département) car les estimations régionales peuvent masquer des taux élevés au niveau du département (ex. Indre-et-Loire dans la région Centre, et Alpes-Maritimes en PACA)

Conclusions (1)

- En 2014, >156000 personnes vivaient avec le VIH, 70% avaient une CV<50 copies/mL
- L'épidémie touche tous les groupes de la population, mais certains groupes (HSH nés en France ou à l'étranger, hétérosexuel(le)s nés en ASS, et UDI nés à l'étranger) sont + touchés que les autres
- Toutes les régions sont touchées par le VIH, mais certaines régions (IDF, PACA et Rhône-Alpes en nombre, Guyane, Guadeloupe, IDF et Martinique en termes de taux) sont + touchés que les autres
- **L'accès au TARV est retardé par des délais entre infection et diagnostic qui restent longs**
- **Défis à relever pour enrayer l'épidémie et réduire la morbidité et mortalité liées au VIH :**
 - Diagnostic tardif du VIH (surtout chez les hommes hétérosexuels), source d'initiation trop tardive du TARV et de nouvelles contaminations
 - Incidence élevée, notamment chez les HSH

Quelques pistes :

- Intensifier les interventions dans certaines régions : Guyane, Guadeloupe, IDF, Martinique, PACA , Rhône-Alpes (>60% de l'épidémie cachée et des nouvelles infections)
- Multiplier les occasions et répéter le dépistage envers les populations les plus affectées et dans les territoires les plus affectés
- Assurer l'accès aux outils de prévention, dont la PrEP, à tous et notamment, aux populations les plus affectées et dans les territoires les plus affectés
- **Déterminer, informer sur et prendre en compte les spécificités régionales/départementales**

**Aller vers une connaissance encore
plus fine**

Exemple : l'Ile-de-France

Nb et taux de personnes non diagnostiquées en IDF en 2014

	Nombre de personnes non diagnostiquées (95% CI)	Taille population 18-64 ans (95% CI)	Prevalence du VIH non diagnostiqué pour 10000 (95% CI)
Total	10117 (8933-11386)	7557029	13,4 (11,8-15,1)
Hommes	7165 (71%) (6023-8341)	3677890	19,5 (16,4-22,7)
Femmes	2952 (29%) (2488-3447)	3879139	7,6 (6,4-8,9)

42% des infections non diagnostiquées en France, taux 2 fois plus que le taux national

Nb et taux de personnes non diagnostiquées en IDF en 2014

Nombre de personnes non diagnostiquées (95% CI)

Total	10117 (8933-11386)
Hommes	7165 (6023-8341)
Femmes	2952 (2488-3447)
HSH nés en France	2248 (22%) (1848-2741)
HSH nés à l'étranger	1094 (11%) (841-1468)
Hétérosexuelles nées à l'étranger	2455 (24%) (2099-2819)
Hétérosexuelles nées en ASS	2084 (85%) (1739-2415)
Hétérosexuels nés à l'étranger	2531 (25%) (2078-3143)
Hétérosexuels nés en ASS	2019 (80%) (1631-2476)
Hétérosexuelles nées en France	463 (5%) (330-649)
Hétérosexuels nés en France	706 (7%) (468-1047)
Usagers de drogues injectables (UDI)	139 (1%) (56-381)


Nb et taux de personnes non diagnostiquées en IDF en 2014

	Nombre de personnes non diagnostiquées (95% CI)	Taille population 18-64 ans (95% CI)	Prevalence du VIH non diagnostiqué pour 10000 (95% CI)
Total	10117 (8933-11386)	7557029	13,4 (11,8-15,1)
Hommes	7165 (6023-8341)	3677890	19,5 (16,4-22,7)
Femmes	2952 (2488-3447)	3879139	7,6 (6,4-8,9)
HSH nés en France	2248 (22%) (1848-2741)	68775 (40687-107589)	343,9 (210,6-545,8)
HSH nés à l'étranger	1094 (11%) (841-1468)	25275 (14953-39539)	453,2 (276,7-700,0)
Hétérosexuelles nées à l'étranger	2455 (24%) (2099-2819)	1067663 (1067259-1068035)	23,0 (19,7-26,4)
Hétérosexuelles nées en ASS	2084 (85%) (1739-2415)	227960 (227874-228040)	91,4 (76,2-105,9)
Hétérosexuels nés à l'étranger	2531 (25%) (2078-3143)	957877 (943163-968345)	26,4 (21,7-33,2)
Hétérosexuels nés en ASS	2019 (80%) (1631-2476)	201135 (198045-203333)	100,3 (80,6-122,7)
Hétérosexuelles nées en France	463 (5%) (330-649)	2805259 (2804198-2806237)	1,6 (1,2-2,3)
Hétérosexuels nés en France	706 (7%) (468-1047)	2606438 (2566402-2634922)	2,7 (1,8-4,0)
Usagers de drogues injectables (UDI)	139 (1%) (56-381)	25742 (20723-30602)	54,4 (21,0-131,5)

Nb et Taux pour 10000 personnes non diagnostiquées en 2014

IDF : 10117 (8933-11386)

13,4 (11,8-15,1)



Nb de personnes non diagnostiquées pour 10000 en 2014

	IDF	Paris
Total	10117 (8933-11386)	3798 (3128-4513)
HSH	3341 (33%) (2863-3890)	1760 (46%)
HSH nés en France	2248 (67%) (1848-2741)	1104 (63%) (875-1377)
HSH nés à l'étranger	1094 (33%) (841-1468)	656 (37%) (463-917)
Hétéro, nées à l'étranger	2455 (24%) (2099-2819)	714 (19%) (551-909)
Hétéro, nées en ASS	2084 (85%) (1739-2415)	633 (87%) (476-809)
Hétéro nés à l'étranger	2531 (25%) (2078-3143)	819 (22%) (592-1151)
Hétéro, nés en ASS	2019 (80%) (1631-2476)	628 (75%) (464-865)
Hétéro, nées en France	463 (5%) (330-649)	107 (3%) (53-223)
Hétéro, nés en France	706 (7%) (468-1047)	202 (5%) (103-356)
UDI	139 (1%) (56-381)	

En IDF : >8/10 des non diagnostiquées sont HSH (3/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (5/10)
 A Paris : ~9/10 des non diagnostiquées sont HSH (5/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (4/10)

Nb de personnes non diagnostiquées pour 10000 en 2014

	IDF	Paris	Hauts-de-Seine
Total	10117 (8933-11386)	3798 (3128-4513)	1157 (881-1528)
HSH	3341 (33%) (2863-3890)	1760 (46%)	443 (38%) (295-721)
HSH nés en France	2248 (67%) (1848-2741)	1104 (63%) (875-1377)	
HSH nés à l'étranger	1094 (33%) (841-1468)	656 (37%) (463-917)	
Hétéro, nées à l'étranger	2455 (24%) (2099-2819)	714 (19%) (551-909)	312 (27%) (210-463)
Hétéro, nées en ASS	2084 (85%) (1739-2415)	633 (87%) (476-809)	263 (84%) (166-392)
Hétéro nés à l'étranger	2531 (25%) (2078-3143)	819 (22%) (592-1151)	216 (19%) (110-416)
Hétéro, nés en ASS	2019 (80%) (1631-2476)	628 (75%) (464-865)	162 (75%) (80-294)
Hétéro, nées en France	463 (5%) (330-649)	107 (3%) (53-223)	
Hétéro, nés en France	706 (7%) (468-1047)	202 (5%) (103-356)	
UDI	139 (1%) (56-381)		

En IDF : >8/10 des non diagnostiquées sont HSH (3/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (5/10)

92 : ~8/10 des non diagnostiquées sont HSH (4/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (4/10)

Nb de personnes non diagnostiquées pour 10000 en 2014

	IDF	Paris	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis
Total	10117 (8933-11386)	3798 (3128-4513)	1157 (881-1528)	1318 (1116-1533)
HSH	3341 (33%) (2863-3890)	1760 (46%)	443 (38%) (295-721)	328 (24%) (224-448)
HSH nés en France	2248 (67%) (1848-2741)	1104 (63%) (875-1377)		237 (72%) (160-341)
HSH nés à l'étranger	1094 (33%) (841-1468)	656 (37%) (463-917)		92 (28%) (34-179)
Hétéro, nées à l'étranger	2455 (24%) (2099-2819)	714 (19%) (551-909)	312 (27%) (210-463)	390 (30%) (299-514)
Hétéro, nées en ASS	2084 (85%) (1739-2415)	633 (87%) (476-809)	263 (84%) (166-392)	307 (79%) (229-395)
Hétéro nés à l'étranger	2531 (25%) (2078-3143)	819 (22%) (592-1151)	216 (19%) (110-416)	440 (33%) (292-586)
Hétéro, nés en ASS	2019 (80%) (1631-2476)	628 (75%) (464-865)	162 (75%) (80-294)	358 (81%) (257-491)
Hétéro, nées en France	463 (5%) (330-649)	107 (3%) (53-223)		
Hétéro, nés en France	706 (7%) (468-1047)	202 (5%) (103-356)		
UDI	139 (1%) (56-381)			

En IDF : >8/10 des non diagnostiquées sont HSH (3/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (5/10)

93 : ~8/10 des non diagnostiquées sont HSH (2/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (6/10)

Nb de personnes non diagnostiquées pour 10000 en 2014

	IDF	Paris	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val d'Oise
Total	10117 (8933-11386)	3798 (3128-4513)	1157 (881-1528)	1318 (1116-1533)	1074 (804-1507)
HSH	3341 (33%) (2863-3890)	1760 (46%)	443 (38%) (295-721)	328 (24%) (224-448)	151 (14%) (75-260)
HSH nés en France	2248 (67%) (1848-2741)	1104 (63%) (875-1377)		237 (72%) (160-341)	
HSH nés à l'étranger	1094 (33%) (841-1468)	656 (37%) (463-917)		92 (28%) (34-179)	
Hétéro, nées à l'étranger	2455 (24%) (2099-2819)	714 (19%) (551-909)	312 (27%) (210-463)	390 (30%) (299-514)	393 (37%) (66-679)
Hétéro, nées en ASS	2084 (85%) (1739-2415)	633 (87%) (476-809)	263 (84%) (166-392)	307 (79%) (229-395)	291 (74%) (199-429)
Hétéro nés à l'étranger	2531 (25%) (2078-3143)	819 (22%) (592-1151)	216 (19%) (110-416)	440 (33%) (292-586)	324 (30%) (165-596)
Hétéro, nés en ASS	2019 (80%) (1631-2476)	628 (75%) (464-865)	162 (75%) (80-294)	358 (81%) (257-491)	181 (56%) (16-418)
Hétéro, nées en France	463 (5%) (330-649)	107 (3%) (53-223)			
Hétéro, nés en France	706 (7%) (468-1047)	202 (5%) (103-356)			
UDI	139 (1%) (56-381)				

En IDF : >8/10 des non diagnostiquées sont HSH (3/10) ou hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (5/10)
 95 : ~8/10 des non diagnostiquées sont HSH (1/10) ou des hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (7/10)

Taux de personnes non diagnostiquées pour 10000 en 2014

	IDF	Paris	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val d'Oise
Total	13,4 (11,8-15,1)	25,2 (20,7-29,9)	11,5 (8,8-15,2)	13,6 (11,5-15,8)	14,5 (10,8-20,3)
Hommes	19,5 (16,4-22,7)				
Femmes	7,6 (6,4-8,9)				
HSH	373,2 (237,3-557,7)	286,8 (150,9-488,9)	700,6 (336,4-1428,3)	519,4 (262,2-939,7)	321,0 (119,6-680,7)
HSH nés en France	343,9 (210,6-545,8)	248,2 (128,5-433,7)		651,7 (321,2-1193,5)	
HSH nés à l'étranger	453,2 (276,7-700,0)	388,8 (179,1-659,8)		342,1 (99,2-797,6)	
Hétéro, nées à l'étranger	23,0 (19,7-26,4)	30,3 (23,4-38,6)	22,0 (14,8-32,6)	19,6 (15,1-25,9)	34,8 (22,3-52,6)
Hétéro, nées en ASS	91,4 (76,2-105,9)	174,5 (131,3-223,1)	93,5 (58,9-139,5)	65,8 (49,1-84,7)	120,1 (82,1-177,1)
Hétéro nés à l'étranger	26,4 (21,7-33,1)	45,9 (32,9-65,0)	18,3 (9,3-35,5)	22,4 (14,8-29,8)	33,2 (16,9-61,1)
Hétéro, nés en ASS	100,3 (80,6-122,7)	219,6 (162,0-297,1)	73,4 (36,0-133,9)	81,0 (58,0-111,3)	123,9 (59,6-236,5)
Hétéro, nées en France	1,6 (1,2-2,3)	1,9 (1,0-4,0)			
Hétéro, nés en France	2,7 (1,8-4,0)	4,3 (2,2-7,5)			
UDI	54,4 (21,0-131,5)	77,3 (18,0-255,3)			



Conclusions (2)

- En 2014, >**10000** personnes vivaient avec le VIH sans le savoir en IDF
- **L'IDF est une région clé dans la lutte contre le VIH (>42% des infections non diagnostiquées, et hub)**
- Les populations les plus affectées sont les HSH nés en France ou à l'étranger, et les hétérosexuel(le)s nés à l'étranger (notamment en ASS). Ces populations représentent **>70% à 90% des personnes non diagnostiquées** selon le département
- Les délais entre infections et diagnostics restent longs (surtout chez les hommes hétérosexuels), source d'initiation trop tardive du TARV et de nouvelles contaminations
- **Paris : ~40% des infections diagnostiquées d'IDF et taux du VIH non diagnostiqué 2 fois plus élevé qu'en IDF (4 fois plus élevé que le taux national)**
- **Informez sur et prenez en compte les spécificités départementales, par ex.:**
 - Val d'Oise : 7/10 des personnes non diagnostiquées sont des femmes/hommes nés à l'étranger et 1/10 des HSH
 - Paris : 4/10 des personnes non diagnostiquées sont des femmes/hommes nés à l'étranger et 5/10 des HSH (2/10 des HSH nés à l'étranger)
- **Intensifier les actions envers les hétérosexuel(le)s nés à l'étranger en IDF (et notamment en banlieue) et celles envers les HSH dans Paris/Grand Paris?**

Taux standardisé des bénéficiaires de l'ALD pour VIH (ALD 7) en 2013 pour 100000 personnes par canton ou ville en IDF*

Femmes : 15 244 ALD VIH

Hommes : 29 922 ALD VIH



Taux standardisés
pour 100 000

- 2000 - 3421
- 800 - 1999
- 350 - 799
- 200 - 349
- 0 - 199
- pop. < 5000
hommes/femmes

* standardisation sur l'âge réalisée en prenant comme structure de référence la population de la France en 2012.
Sources : CnamTS, RSI, Insee RP2012, exploitation ORS Île-de-France.

► Faire la cartographie des nouvelles ALD pour VIH

Conclusions (3)

Les indicateurs épidémiologiques au niveau des territoires (région, département) :

- **nb et taux d'infections non diagnostiquées par population**, ou à défaut répartition des nx diagnostics (cumulées sur les 5 dernières années) par département et par population, et cartographie des nouvelles ALD (cumulées sur les 5 dernières années) par ville et ou canton
- **incidence par population**

Problème : décalage dans le suivi de ces indicateurs (à cause notamment des délais de notification pour la DO)

Importance de collecter des indicateurs sur les programmes et interventions

Indicateur de monitoring (F. Lert) au niveau local par les services volontaires : nombre nx diagnostic dans les services (H/F), nx de dépistage + nx positif (CEGGID, un centre de santé sexuelle), nb d'entrée en PrEP et file active sous PrEP