

Connaissance des patients vivant avec le VIH sur les traitements antirétroviraux injectables (ARV LA), dans un service de médecine infectieuse et quatre associations de patients, en Ile-de-France

Certain A.¹, Berki Z.¹, Benyoucef Ali D.¹, Rzonca W.¹, Sinna A.¹, Abdurazak F.¹, Roux F.¹, Ronse L.², Ferrarini Y.³, Belhous I.³, Peltier A.⁴, Allouch L.⁴, Horri N.⁵, Le Gac S.⁶, Digumber M.⁶, Landman R.⁶, Yazdanpanah Y.¹, Ghosn J.^{1,6}

1. Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Bichat, Paris
2. Association Dessine Moi Un Mouton (DMUM) Paris
3. Association Actions Traitements, (AT) Paris
4. Association Basiliade (B), antenne URACA (BU), Paris
5. Association Comité des Familles (CF) Paris
6. COREVIH Ile-de-France Nord



Introduction/objectif

Les ARV LA sont disponibles en France depuis janvier 2022. Malgré des indications relativement larges, il semble que le nombre de bénéficiaires croisse lentement. L'objectif est de recueillir des éléments de compréhension par la description des modalités et de la nature des informations sur les ARV LA, d'un échantillon de patients inclus dans un parcours d'éducation thérapeutique (ETP) issus d'un service de médecine infectieuse (SMIT) et 4 associations parisiennes.










Méthode

Recueil anonymisé d'informations en séance ETP, 2 semaines données par les soignants ETP du SMIT Bichat et 4 associations (Dessine Moi Un Mouton (DMUM), Actions Traitements (ATTT), Basiliade, antenne Uraca, Comité des Familles (CDF)) : données sociodémographiques, connaissance ou non des ARV LA, nature, mode et souhait d'informations, souhait et raisons de traitement ou non par ARV LA.

Résultats



	ATTT N=16	Basiliade N=5	CDF N=4	DMUM N=8	SMIT N=34	URACA N=8	Total N=75
Genre							
Homme	69 (11)	20 (1)	25 (1)	/	62 (21)	25 (2)	35 (26)
Femme	31 (5)	80 (4)	75 (3)	100 (8)	32 (11)	75 (6)	63 (47)
Transgenre	/	/	/	/	6 (2)	/	3 (2)
Age							
Age médian	58	39	36	37	46	37	44
Année	[44-74]	[38-40]	[27-75]	[20-44]	[23-83]	[26-54]	[20-83]
Mode de contamination							
Sexuel	69 (11)	100 (5)	25 (1)	63 (5)	97 (33)	/	73 (55)
Transfusion	19 (3)	/	50 (2)	13 (1)	/	/	8 (6)
Materno-foetal	/	/	/	13 (1)	/	/	1 (1)
Toxicomanie	/	/	/	/	3 (1)	/	1 (1)
DM (données manquantes)	13(2)	/	25 (1)	13 (1)	/	100 (8)	16 (12)
Année de découverte VIH							
< 3 ans	6 (1)	/	25 (1)	25 (2)	12 (4)	38 (3)	15 (11)
[3-20[13 (12)	100 (5)	75 (3)	50 (4)	62 (21)	63 (5)	53 (40)
> 20 ans	75 (1)	/	/	25 (2)	26 (9)	/	31 (23)
Activité							
Emploi salarié	13 (2)	40 (2)	/	38 (3)	44 (15)	/	29 (22)
Emploi indépendant	/	/	/	/	3 (1)	/	1 (1)
Retraité	31 (5)	/	/	/	12 (4)	88 (7)	12 (9)
Sans Emploi	44 (7)	60 (3)	100 (4)	63 (5)	41 (14)	13 (1)	53 (40)
DM	13 (2)	/	/	/	/	/	4 (3)
Statut de vie							
Célibataire	69 (11)	60 (3)	25 (1)	25 (2)	41 (14)	/	41 (31)
Concubin	31 (5)	40 (2)	50 (2)	75 (6)	24 (8)	75 (6)	39 (29)
Marié.e	/	/	/	/	29 (10)	/	13 (10)
Divorcé.e/séparé.e	/	/	25 (1)	/	3 (1)	/	3 (2)
Veuf.ve	/	/	/	/	3 (1)	/	1 (1)
DM	/	/	/	/	/	25 (2)	3 (2)
Habitat							
Domicile personnel	75 (12)	20 (1)	25 (1)	25 (2)	74 (25)	/	55 (41)
Hébergement (famille, ami)	/	/	/	/	12 (4)	/	5 (4)
Hébergement (asso, 115, autre)	6 (1)	80 (4)	75 (3)	50 (4)	15 (5)	/	23 (17)
SDF	13 (2)	/	/	25 (2)	/	88 (7)	15 (17)
DM	6 (1)	/	/	/	/	13 (1)	3 (2)
Début du traitement ARV par tranche							
Depuis < 3 ans	6 (1)	/	25 (1)	25 (2)	12 (4)	13 (1)	12 (9)
Depuis [3 – 21 ans[13 (2)	100 (5)	75 (3)	75 (6)	68 (23)	50 (4)	57 (43)
Depuis [21 – 39 ans[63 (10)	/	/	/	21 (7)	/	23 (17)
DM	19 (3)	/	/	/	/	38 (3)	8 (6)
ARV en cours	94 (15) 1 DM	100 (5)	75 (3) 1 DM	100 (8)	100 (34)	88 (7) 1 DM	96 (72)



« C'est plus simple, comme ça, je ne pense plus au traitement »

« Je préfère contrôler ma prise par les comprimés moi-même »

« C'est vraiment bien, je n'ai plus à me cacher pour prendre le traitement »

« Je ne peux pas prendre ces traitements injectables car je veux des enfants »

Discussion-conclusion

Les patients ont des informations partielles sur les ARV LA via leurs médecins et les acteurs du parcours de soins, les associations et les médias, soulignant l'importance de leur clarification en ETP.