



# Mpox : conduite à tenir

## Vaccination

- Personnes avec partenaires sexuels multiples, Professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.
- Indications au cas par cas pour les professionnels de santé prenant en charge les personnes infectées, ou professionnels de laboratoire concerné
- Pas d'indication à une nouvelle injection si vaccination complète ou infection depuis 2022

## Rappels

- **Lésions** cutanées ou muqueuses, parfois très douloureuses, adénopathies, fièvre, céphalées, myalgies, asthénie.
- Guérison spontanée en 3 semaines environ.
- **Transmission** par contact direct avec des lésions cutanées ou muqueuses, ou par gouttelettes respiratoires lors d'un contact direct et prolongé en face à face, ou par contact avec des matériaux contaminés, ou par contact avec un animal infecté.
- **Incubation** : 5 à 21 jours

## Prise en charge

- **Précautions Contact et Air** jusqu'à la disparition des croûtes. Couvrir les lésions.
- **Déchets** : DASRI, linge : circuit habituel
- **Prélèvements** des lésions pour PCR, à acheminer en triple emballage
- **Déclaration obligatoire**
- **Inform**er l'EPRI/EOH et le service de santé au travail

## Prévention des cas secondaires

- ▶ **Recenser les contacts à risque, non vaccinés ou infectés depuis 2022, parmi les personnels et proches du cas**

Exemples : contact sans gants avec lésion cutanée ou muqueuse, exposition aux liquides biologiques sans protection, partenaires sexuels, contacts proches au domicile...

- ▶ **Vaccination** idéalement dans les 4 jours suivant le contact à risque et au maximum dans les 14 jours
  - *Imvanex ou Jynneos 2 doses espacées de 28j, 3 doses si immunodéprimés*
  - *Une seule dose pour les personnes nées < 1980 ayant reçu une dose de vaccin antivariolique*

Pour en savoir plus : [DGS urgent-16.08.2024](#), [Calendrier vaccinal 2024](#), [COREB](#)