

9- Parmi les informations suivantes concernant l'infection à VIH, laquelle est exacte ?

- A - Si une personne est infectée par le VIH mais l'ignore, elle n'a aucun risque de voir son infection évoluer vers un SIDA
- B - Suivre un traitement anti-VIH nécessite d'avaler beaucoup de comprimés chaque jour
- C - Il est impossible d'avoir un enfant en cas d'infection à VIH
- D - L'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH qui prennent un traitement efficace contre le VIH est comparable à celle de la population générale
- E - Je ne sais pas

10- Si une femme vivant avec le VIH vient d'accoucher, elle peut allaiter son enfant :

- A - C'est VRAI, avec un suivi très strict pour la mère et pour l'enfant durant tout le temps de l'allaitement
- B - C'est FAUX, le risque de contamination pour le nouveau-né est trop important
- C - C'est VRAI car le lait maternel ne contient pas de VIH
- D - Je ne sais pas

Question bonus : Un vaccin anti-VIH sera disponible dans les trois ans à venir ?

- A - Oui, la recherche a bien avancé sur ce sujet
- B - Non, à l'heure actuelle cette piste n'est plus privilégiée
- C - Il faut l'espérer, les vaccins à ARN messager (comme celui contre le COVID-19) sont peut-être la solution
- D - Je ne sais pas

Un quiz complété – un cadeau sur le stand

Merci pour votre participation

QUIZ

Tester vos connaissances sur le VIH/SIDA

Une seule réponse par question

Vous pouvez obtenir les réponses en flashant le QR-Code ou en vous adressant aux personnes sur le stand.



JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

**« Le VIH nous concerne tous.
Prévenir, dépister, traiter :
agissons ensemble. »**



1- Le nombre de personnes vivant avec le VIH en France est de l'ordre de :

- A - 5 000
- B - 25 000
- C - 200 000
- D - 2 millions
- E - Je ne sais pas

2- Pourquoi « faire un dépistage du VIH » est important, quel que soit son âge ?

- A - Pour éliminer au plus vite le virus VIH
- B - Ça ne sert à rien si on se sent en bonne santé
- C - Pour bénéficier d'un traitement efficace le plus tôt possible (en cas de test positif) et ainsi rester en bonne santé et protéger ses partenaires sexuels
- D - Je ne sais pas

3- Concernant le dépistage du VIH et des autres IST, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

- A - Il faut obligatoirement une ordonnance médicale pour faire un dépistage des IST dans un laboratoire de ville
- B - Le dépistage est essentiel car l'infection au VIH ou à d'autres IST peut passer inaperçue, parfois pendant des années
- C - Le dépistage du VIH se fait dans les urines
- D - Le dépistage des IST consiste seulement à faire une prise de sang
- E - Je ne sais pas

4- Pour me rassurer sur mon statut sérologique VIH, je peux acheter en pharmacie et faire chez moi un Autotest VIH. Son résultat sera fiable si et seulement si...

- A - Dans tous les cas l'autotest sera fiable, si c'est négatif c'est que je n'ai pas le VIH
- B - Je n'ai pas eu de rapport sexuel ou si j'ai eu uniquement des rapports protégés par un préservatif au cours des 3 derniers mois
- C - Les autotests ne sont pas fiables
- D - Si le dernier rapport sexuel non protégé date de moins de 6 semaines
- E - Je ne sais pas

5- Qu'est-ce qui est le plus efficace pour empêcher la transmission du VIH et des autres IST lors des rapports sexuels ?

- A - Utiliser un préservatif (interne ou externe)
- B - Se laver immédiatement après le rapport
- C - Se retirer avant l'éjaculation
- D - Utiliser des contraceptifs oraux (pilule)
- E - Je ne sais pas

6- Ces moyens de prévention sont tous efficaces pour diminuer le risque de transmission du VIH sauf un, lequel ?

- A - Le dépistage du VIH et des IST avec son/sa partenaire avant d'avoir des rapports sexuels
- B - Le préservatif (interne ou externe)
- C - La PrEP
- D - Le TasP (Une personne vivant avec le VIH sous traitement efficace ne transmet plus le virus lors des rapports sexuels)
- E - Le stérilet (Dispositif Intra Utérin)
- F - Je ne sais pas

7- La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) est un moyen de prévention du VIH très efficace qui s'adresse principalement :

- A - Aux personnes vivant déjà avec le VIH
- B - Aux personnes séronégatives exposées à un risque très élevé d'infection par le VIH
- C - À toute personne souhaitant éviter une grossesse
- D - Uniquement aux personnes âgées de plus de 50 ans
- E - Je ne sais pas

8- Concernant le Traitement Post Exposition (TPE) prescrit en urgence en cas de situation à risque de transmission du VIH, quelle proposition est exacte ?

- A - Le TPE permet de diminuer très fortement le risque de transmission du VIH suite à un rapport sexuel non protégé s'il est pris le plus tôt possible
- B - Il est possible de débuter un TPE plus de 72 heures après une exposition à risque de transmission
- C - Le TPE ne nécessite pas de suivi médical et peut être pris en pharmacie
- D - Le TPE n'est pas remboursé par la sécurité sociale
- E - En cas de piqûre avec une aiguille souillée, il n'est pas nécessaire d'aller aux urgences
- F - Je ne sais pas